

Erebia epiphron KNOCH, een nieuwe soort voor de Griekse fauna (Lepidoptera : Satyridae)

door

Dirk VAN DER POORTEN

Abstract. *Erebia epiphron* KNOCH, a new species to the greek fauna (Lepidoptera : Satyridae). Some specimens of *Erebia epiphron* KNOCH were caught in the Vernon mountains (Greece, Florina district) on 14-vii-1984, where they were flying among the common *E. ottomana* HERRICH-SCHAFFER at an altitude of 2000 m. The specimens belong to ssp. *roosi* ARNSCHEID & STERBA. The species is new to the greek fauna.

Résumé. *Erebia epiphron* KNOCH, espèce nouvelle pour la faune grecque (Lepidoptera : Satyridae). Quelques exemplaires d'*Erebia epiphron* KNOCH furent récoltés le 24-vii-1984 dans la montagne du Vernon (Grèce, district de Florina). Les exemplaires volaient parmi de très nombreux *E. ottomana* HERRICH-SCHAFFER à une altitude de 2000 mètres. Ils appartiennent à la ssp. *roosi* ARNSCHEID & STERBA. L'espèce est nouvelle pour la faune grecque.

Tijdens mijn zomerexcursie van 1984 in Griekenland, vergezeld door Jan SCHUURMANS, bezocht ik op 14 juli een van de hogere toppen van het Vernon gebergte in het distrikt Florina. Vana^f ongeveer 1600 m hoogte was *Erebia ottomana* HERRICH-SCHAFFER een gewone soort. Op de top van deze berg (ongeveer 2000 m) vloog er tussen de talrijke *ottomana* een zeldzamere, kleinere *Erebia*-soort, die ik onmiddellijk determineerde als *epiphron* KNOCH. Ik kon een tiental exemplaren waarnemen waaronder slechts één wijfje.

Nergens kon ik een literatuuropgave van de aanwezigheid van *epiphron* in Griekenland terugvinden zodat deze soort nu als nieuw aan de lijst van de Griekse dagvlinders kan toegevoegd worden. Een ware verrassing is deze waarneming echter niet. THURNER (1964) vermeldt de soort van verschillende vindplaatsen uit Joegoslavisch Makedonia met als zuidelijkste vindplaats de Pelister, de hoogste top van de Baba Planina, het gebergte dat in feite een geheel vormt met het Griekse Vernongebergte. ARNSCHEID & STERBA beschreven in 1978 de subspecies *roosi* uit Makedonia met als typelokaliteit de Pelister. Mijn exemplaren voldoen in alle opzichten aan de beschrijving hiervan.

Literatuur

- Arnscheid, W. & Sterba, V., 1978. Eine neue subspecies von *Erebia epiphron* aus dem Pelistergebirge in Mazedonien (Lep. : Satyridae). *Ent.Z.*, Frankf.a.M. **88**(22) : 257-260.
- Thurner, J., 1964. Die Lepidopterenfauna Jugoslavisch Mazedoniens 1, Pirodonaucen Muzej, Skopje.

van der Poorten D. : Lanteernhofstraat 26, B-2200 Antwerpen-Borgerhout.